



INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE SAÚDE (ISCISA)

EXAME ESPECIFICO DE CIRURGIA – Variante A

Data: 23 /02/2022

Duração: 90 Minutos

ASSINALE COM UMA CIRCUNFERÊNCIA (O) A ÚNICA ALÍNEA VERDADEIRAMENTE CORRECTA DE CADA PERGUNTA.

1. O antisséptico cutâneo mais eficaz é o iodo a:
- a)-20% em álcool a 70%;
 - b)-10% em álcool a 90%;
 - c)-15% em álcool a 90%;
 - d)-20% em álcool a 90%;
 - e)-10% em álcool a 70%.
2. As úlceras cutâneas com bordos arredondados podem corresponder a um(a):
- a)-carcinoma escamocelular;
 - b)-sarcoma de Kaposi;
 - c)-carcinoma epidermóide;
 - d)-melanoma maligno;
 - e)-carcinoma basocelular.
3. Segundo a OMS considera-se anemia quando a Hgb na mulher é inferior a:
- a)-08 gr/dl;
 - b)-14 gr/dl;
 - c)-12 gr/dl;
 - d)-11 gr/dl;
 - e)-10 gr/dl
4. Após uma cirurgia limpa e em incisões fechadas sem tensão, os pontos devem ser retirados em:
- a)-03 a 05 dias;
 - b)-07 a 10 dias;
 - c)-10 a 12 dias;
 - d)-05 a 07 dias;
 - e)-12 a 15 dias.
5. As feridas incisivas podem ser suturadas desde que tenham menos de
- a)-24 horas;
 - b)-08 horas;
 - c)-10 horas;
 - d)-12 horas;
 - e)-06 horas.
6. O pior soro para combater o choque hipovolémico hemorrágico é o(a):
- a)-soro fisiológico;
 - b)-dextrose a 05%;
 - c)- lactato de ringer;
 - d)-hemacel;
 - e)-polielectrolítico de restituição.
7. O agente etiológico da erisipela é o(a):
- a)-Streptococcus;
 - b)-Pseudomona;
 - c)-Staphilococcus;
 - d)-Escheríchia coli;
 - e)-Salmonela.
8. A tesoura usada para a diérese dos tecidos moles é a de:
- a)-Mayo;
 - b)-Halsted;
 - c)-Mixer;
 - d)-Metzembraun;
 - e)-Rochester.
9. A causa mais frequente de linfedema crónico em Moçambique é o(a):
- a)-infiltração neoplásica dos gânglios linfáticos;
 - b)-Wuchereria bancrofti;
 - c)-excisão cirúrgica dos gânglios linfáticos;
 - d)-Micobactérium tuberculosis;
 - e)-linfogranuloma inguinal.
10. O canal que comunica a vesícula biliar com a via biliar principal chama-se:
- a)-colédoco;
 - b)-de Santorini;
 - c)-cístico;
 - d)-hepático comum;
 - e)-de Wirsung.
11. O cesto destinado a receber as gazes e compressas usadas, restos de fios, etc chama-se cesto de:
- a)-Kocher;
 - b)-Havers;
 - c)-Hamper;
 - d)-Volkman;
 - e)-Harper.

12.A abertura de uma comunicação entre a traqueia e o exterior chama-se:

- a)-traqueostomia;
- b)-traquelotomia;
- c)-traqueoplastia;
- d)-traqueloplastia;
- e)-traqueotomia.

13.As pinças hemostáticas mais comuns recebem também a designação de pinças de:

- a)-Mixer;
- b)-Halsted;
- c)-Kelly;
- d)-Crile;
- e)-Rochester

14.A toma de anticoagulantes (p.e. varfarina e aspirina) deve ser interrompida alguns dias antes das cirurgias electivas, nomeadamente:

- a)-3 dias antes;
- b)-5 dias antes;
- c)-7 dias antes;
- d)-10 dias antes;
- e)-12 dias antes.

15.O anestésico geral mais usado nos Hospitais Rurais é o (a)

- a)-lidocaína;
- b)-tiopental;
- c)-bupivacaína;
- d)-halotano;
- e)-quetamina.

16.O paciente pode ser operado se a sua glicémia for de:

- a)-2 a 4 mmol/l;
- b)-8 a 12 mmol/l;
- c)-10 a 14 mmol/l;
- d)-5 a 7 mmol/l;
- e)-12 a 16 mmol/l.

17.A bactéria que pode invadir pequenas fissuras na pele e propagar-se através do tecido conjuntivo e dos linfáticos é o (a):

- a)-Staphylococcus aureus;
- b)-Klebsiella;
- c)-Streptococcus pyogenes;
- d)-Escheríchia coli;
- e)-Bacterioides.

18.A infecção cirúrgica mais comum é o (a):

- a)-celulite;
- b)-abcesso;
- c)-foliculite;
- d)-erisipela;
- e)-fleimão.

19.Os sintomas do tétano mais severo surgem algum tempo depois da contaminação, nomeadamente:

- a)-15 a 20 dias;
- b)-1 a 3 dias;
- c)-7 a 10 dias;
- d)-10 a 15 dias;
- e)-20 a 25 dias.

20.A monitorização adequada do débito urinário é feita após a cateterização com o catéter de:

- a)-Béquile;
- b)-Levine;
- c)-Felty;
- d)-Pezzer;
- e)-Foley.

ASSINALE COM UMA CIRCUNFERÊNCIA (O) A ÚNICA ALÍNEA CLARAMENTE ERRADA DE CADA PERGUNTA.

21. A Hgb mínima aceitável para se operar um doente depende:

- a)- de se há doença respiratória associada;
- b)-de se há doença digestiva associada;
- c)-da idade do paciente;
- d)-do tipo de cirurgia a realizar;
- e)-de se há doença cardiovascular associada.

22. São efeitos secundários frequentes da VAT:

- a)-as complicações neurológicas;
- b)-a febre e a dor local;
- c)-as reacções alérgicas;
- d)-o eritema e o edema locais;
- e)-o malestar geral e a irritabilidade

23. É causa de abdómen agudo oclusivo (obstrutivo):

- a)-a pancreatite aguda;
- b)-as aderências ou bridas;
- c)-as hérnias da parede abdominal;
- d)-o volvo do sigmóide;
- e)-a invaginação intestinal

- 24. É um agente desinfectante químico o:**
a)-álcool etílico;
b)-óxido de etileno;
c)-formaldeído;
d)-fenol;
e)-hexaclorofeno.
- 25. A intoxicação por monóxido de carbono caracteriza-se por:**
a)-visão turva;
b)-fatigabilidade fácil;
c)-irritabilidade;
d)-náuseas;
e)-alucinações.
- 26. É complicação pós-operatória precoce o(a):**
a)-hemorragia;
b)-broncopneumonia;
c)-tromboembolismo;
d)-atelectasia pulmonar;
e)-escara de decúbito.
- 27. É um dreno tubular o de:**
a)-Foley;
b)-Pezzer;
c)-Naleton;
d)-Penrose;
e)-Malecot.
- 28. Quanto à profundidade as queimaduras classificam-se em:**
a)-1° grau;
b)-3° grau;
c)-2° grau superficial;
d)-4° grau;
e)-2° grau profundo.
- 29. As cobras venenosas podem ter venenos:**
a)-neurotóxicos;
b)-hematotóxicos;
c)-citotóxicos;
d)-hepatotóxicos;
e)-mixtos.
- 30. Os intoxicados por organofosforados podem apresentar:**
a)-sudação;
b)-bradicardia;
c)-miose;
d)-fasciculação muscular;
e)-taquicardia.
- 31. É factor que diminui a síntese de colagénio o (a):**
a)-hipoproteinémia;
b)-diabetes mellitus;
c)-hipovolémia;
d)-idade avançada;
e)-obesidade.
- 32. Podem provocar raiva as mordeduras de:**
a)-humanos;
b)-morcegos;
c)-crocodilos;
d)-gatos;
e)-ratos.
- 33. É vitamina lipossolúvel a vitamina:**
a)-K;
b)-A;
c)-E;
d)-C;
e)-D.
- 34. A ressuscitação bem sucedida caracteriza-se por:**
a)-pele quente e seca;
b)-diurese de 30-50 ml/hora;
c)-pele quente e húmida;
d)-lucidez;
e)-pele bem perfundida.
- 35. É medida importante na profilaxia das infecções pós-operatórias a:**
a)-adequada preparação pré-operatória;
b)-assépsia e antissépsia;
c)-antibioterapia prolongada;
d)-hemostasia meticulosa;
e)-antibioterapia profilática

36. Sugere degenerescência maligna de um nevus o (a):

- a)-alteração brusca do tamanho;
- b)-alteração lenta da cor;
- c)-surgimento de linfadenopatia regional;

- d)-ocorrência de prurido;
- e)-aparecimento de secreção hemática

37. É tumoração da pele o:

- a)-melanoma;
- b)-ganglion;
- c)-linfangioma;

- d)-hemangioma;
- e)-papiloma.

38. É órgão-alvo da hipertensão arterial o (a):

- a)-cérebro;
- b)-coração;
- c)-fígado;

- d)-olho;
- e)-rim

39. As cobras venenosas possuem venenos:

- a)-neurotóxicos;
- b)-nefrotóxicos;
- c)-citotóxicos;

- d)-hematotóxicos;
- e)-mixtos.

40. É sinal de uma anestesia geral superficial:

- a)-movimentos do doente;
- b)-lacrimação;
- c)-depressão respiratória;

- d)-frequência cardíaca estável ou aumentada;
- e)-aumento da tensão arterial

BOM TRABALHO!